

静岡市薬剤師会 御中

令和4年6月29日
静岡済生会総合病院 薬剤科

令和4年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和4年7月6日より処方開始となります。

院内院外採用

ベリキューボ錠2.5mg、5mg、10mg (バイエル薬品株式会社)

効能・効果

慢性心不全

ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。

用法・用量

通常、成人にはベルイシグアトとして、1回2.5mgを1日1回食後経口投与から開始し、2週間間隔で1回投与量を5mg及び10mgに段階的に增量する。なお、血圧等患者の状態に応じて適宜減量する。

薬価	2.5mg	1錠	131.5円
	5mg	1錠	230.2円
	10mg	1錠	402.2円

ケシンプタ皮下注20mgペン (ノバルティスファーマ株式会社)

効能・効果

下記患者における再発予防及び身体的障害の進行抑制

再発寛解型多発性硬化症

疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症



用法・用量

通常、成人にはオファツムマブ（遺伝子組換え）として1回20mgを初回、1週後、2週後、4週後に皮下注射し、以降は4週間隔で皮下注射する。

薬価 1キット 230,860円

院内限定採用

ラニビズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」（千寿製薬株式会社）

効能・効果

中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性

病的近視における脈絡膜新生血管

用法・用量

〈中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性〉

ラニビズマブ（遺伝子組換え）[ラニビズマブ後続1]として0.5mg(0.05mL)を1ヶ月毎に連続3ヶ月間（導入期）硝子体内投与する。その後の維持期においては、症状により投与間隔を適宜調節するが、1ヶ月以上の間隔をあけること。

〈病的近視における脈絡膜新生血管〉

ラニビズマブ（遺伝子組換え）[ラニビズマブ後続1]として1回あたり0.5mg(0.05mL)を硝子体内投与する。投与間隔は、1ヶ月以上あけること。

薬価 0.5mg 0.05mL 1筒 79,348円

院外限定採用

ニュベクオ錠 300mg (バイエル薬品株式会社)

効能・効果

遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺

用法・用量

通常、成人にはダロルタミドとして1回600mgを1日2回、食後に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 1錠 2302.9円

レイボー錠 100mg (第一三共株式会社)

効能・効果

片頭痛

用法・用量

通常、成人にはラスマジタンとして1回100mgを片頭痛発作時に経口投与する。ただし、患者の状態に応じて1回50mg又は200mgを投与することができる。

頭痛の消失後に再発した場合は、24時間あたりの総投与量が200mgを超えない範囲で再投与できる。

薬価 100mg 570.9円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周知の程、宜しくお願ひいたします。