

静岡市薬剤師会 御中

令和7年2月28日
静岡済生会総合病院 薬剤部

令和6年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和7年3月5日より処方開始となります。

院内院外採用

イノソリッド配合経腸用半固形剤

(大塚製薬工場)

効能・効果

一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。

用法・用量

通常、成人標準量として1日900～1,500g(900～1,500kcal)を胃瘻より胃内に1日数回に分けて投与する。投与時間は100g当たり2～4分(300g当たり6～12分)とし、1回の最大投与量は600gとする。また、初めて投与する場合は、投与後によく観察を行い臨床症状に注意しながら増量して数日で標準量に達するようにする。なお、年齢、体重、症状及び栄養状態により投与量、投与時間を適宜増減する。

薬価 1パック 300g 432円

クービビック錠25mg・50mg

(塩野義)

効能・効果

不眠症

用法・用量

通常、成人にはダリドレキサントとして1日1回50mgを就寝直前に経口投与する。なお、患者の状態に応じて1日1回25mgを投与することができる。

薬価 25mg 1錠 57.3円
50mg 1錠 57.3円



キュービトル皮下注 4 g / 20 ml (武田薬品)

効能・効果

無又は低ガンマグロブリン血症

用法・用量

通常、人免疫グロブリン G として 50~200mg (0.25~1mL) /kg 体重を週 1 回皮下投与する。2 週間に 1 回投与する場合には、1 週あたりの用量の 2 倍量 [100~400mg (0.5~2mL) /kg 体重] を皮下投与する。

なお、患者の状態に応じて、

1 週又は 2 週あたりの投与量及び投与回数は適宜増減する。

薬価 4 g 20 ml 42,725 円

院外限定採用

アセノベル徐放錠 500 mg (ノーベルファーマ)

効能・効果

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーにおける筋力低下の進行抑制

用法・用量

通常、成人にはアセノイラミン酸として 1 回 2g (本剤 4 錠) を 1 日 3 回食後に経口投与する。なお、投与間隔は約 8 時間とすることが望ましい。

薬価 1 錠 500 mg 2882.6 円

注意 吸湿性が高く、製品包装が 168 錠放送であるため、処方は 1 日量 12 錠の 14 日分単位の処方とする。

ジェミーナ配合錠 (ノーベルファーマ)

効能・効果

月経困難症

生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整

用法・用量

〈月経困難症〉いずれかを選択する。

・1 日 1 錠を毎日一定の時刻に 21 日間連続経口投与し、その後 7 日間休薬する。以上 28 日間を 1 周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29 日目から次の周期を開始し、以後同様に繰り返す。

・1 日 1 錠を毎日一定の時刻に 77 日間連続経口投与し、その後 7 日間休薬する。以上 84 日間を 1 周期とし、出血が終わっているか続いているかに

かかわらず、85日目から次の周期を開始し、以後同様に繰り返す。
(生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整)

・1日1錠を毎日一定の時刻に、通常、14～28日間連続経口投与する。

薬価 1錠 276.8円

注意 オーダー時に21錠ヒート、28錠ヒートの選択をしオーダーする

ビンマックカプセル61mg (ファイザー)

効能・効果

トランスサイレチン型心アミロイドーシス (野生型及び変異型)

用法・用量

通常、成人にはタファミジスとして1回61mgを1日1回経口投与する。

薬価 1カプセル 61mg 35,983.7円

ウゴービ皮下注SD0.25mg、0.5mg、1.0mg、1.7mg、2.4mg

(ノボ ノルディスクファーマ)

効能・効果

肥満症

用法・用量

通常、成人には、セマグルチド (遺伝子組換え) として0.25mgから投与を開始し、週1回皮下注射する。その後は4週間の間隔で、週1回0.5mg、1.0mg、1.7mg及び2.4mgの順に増量し、以降は2.4mgを週1回皮下注射する。なお、患者の状態に応じて適宜減量する。

| | | | | |
|----|--------|--------|------|---------|
| 薬価 | 0.25mg | 0.5ml | 1キット | 1,876円 |
| | 0.5mg | 0.5ml | 1キット | 3,201円 |
| | 1.0mg | 0.5ml | 1キット | 5,912円 |
| | 1.7mg | 0.75ml | 1キット | 7,903円 |
| | 2.4mg | 0.75ml | 1キット | 10,740円 |

令和6年度後期削除品目リスト

| 削除薬品 | 一般名 | 効能・効果 | 同効薬(備考) |
|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| (院外限定採用) シュアポ スト錠0.5mg (製造中止) | レバグリニド | 2型糖尿病 | 【般】 レバグリニド錠0.5mg |
| (院外限定採用) シンメト レル細粒10% (製造中止) | アマンタジン塩酸塩 | パーキンソン症候群 脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性 低下の改善 A型インフルエンザウイルス感染 症 | 【般】 アマンタジン塩酸塩細粒10% |
| D-ソルビトール内用液 6 5%「マルイシ」(製造中 止) | D-ソルビトール | 消化管のX線造影の迅速化、 消化管のX線造影時の便秘の 防止、経口的栄養補給 | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 |
| (院外限定採用)パファリン配 合錠A81(製造中止) | アスピリン、ダイアル ミネート | 下記疾患における血栓・塞栓形 成の抑制 狭心症(慢性安定狭 心症、不安定狭心症) 心筋梗 塞 虚血性脳血管障害(一過性 脳虚血発作(TIA)、脳梗塞) 冠動脈バイパス術(CABG)ある いは経皮経管冠動脈形成術 (PTCA)施行後における血栓・塞 栓形成の抑制 川崎病(川崎病による心血管後遺 症を含む) | バイアスピリン錠100mg |
| ヨウ化カリウム「日医工」 (製造中止) | ヨウ化カリウム | 甲状腺腫(ヨード欠乏による もの及び甲状腺機能亢進症を 伴うもの) 次記疾患に伴う喀痰排出困 難: 慢性気管支炎、喘息 第三期梅毒 | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 |
| (院外限定採用)ロカルトロ ールカプセル0.25(製造中止) | カルシトリオール | 骨粗鬆症 下記疾患におけるビタミンD代謝 異常に伴う諸症状(低カルシウム 血症、しびれ、テタニー、知覚異 常、筋力低下、骨痛、骨病変等) の改善 慢性腎不全 副甲状腺機能低下症 クル病・骨軟化症 | アルファカルシドールカプセル0.25 μ g、1 μ g、液、ワ ンアルファー錠0.5 μ g |
| 院外限定採用 ヒューマトロップ注射用 6mg (製造中止) | ソマトロピン(遺伝子 組換え) | 骨端線閉鎖を伴わない成長ホル モン分泌不全性低身長症 骨端線閉鎖を伴わないターナー 症候群における低身長 骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄 養症(軟骨無形成症・軟骨低形成 症)における低身長 成人成長ホルモン分泌不全症 (重症に限る) | ジェノトロピンゴークイック5.3mg、12mg ソマトロピンB S皮下注10mg、ノルジトロ ピンフレックスプロ10mg、ソグルーヤ皮下 注10mg |
| 院外限定採用 ヒューマトロップ注射用 12mg (製造中止) | ソマトロピン(遺伝子 組換え) | 骨端線閉鎖を伴わない成長ホル モン分泌不全性低身長症 骨端線閉鎖を伴わないターナー 症候群における低身長 骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄 養症(軟骨無形成症・軟骨低形成 症)における低身長 成人成長ホルモン分泌不全症 (重症に限る) | ジェノトロピンゴークイック5.3mg、12mg ソマトロピンB S皮下注10mg、ノルジトロ ピンフレックスプロ10mg、ソグルーヤ皮下 注10mg |

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しくお願いいたします。