

静岡市薬剤師会 御中

令和7年5月29日
静岡済生会総合病院 薬剤部

令和7年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和7年6月4日より処方開始となります。

院内院外採用

オムジャラ錠100mg (グラクソ・スミスクライン)

効能・効果

骨髄線維症

用法・用量

成人は、200mgを1日1回投与。患者の状態により適宜減量。

薬価

1錠 100mg 21,214円

ブルキンザカプセル80mg (ビーワン・メディシNZ)

効能・効果

慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）

原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫

用法・用量

通常、成人にはザヌブルチニブとして1回160mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価


1カプセル 80mg 6,636.1円

ゾレア皮下注300mgペン (ノバルティスファーマ)

効能・効果

気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る）

季節性アレルギー性鼻炎（既存治療で効果不十分な重症又は最重症）



患者に限る)

特発性の慢性蕁麻疹 (既存治療で効果不十分な患者に限る)

用法・用量

〈気管支喘息〉 通常、オマリズマブ (遺伝子組換え) として1回75～600mgを2又は4週間毎に皮下に注射する。1回あたりの投与量並びに投与間隔は、初回投与前血清中総IgE濃度及び体重に基づき、投与量換算表により設定する、添付文書参照。

〈季節性アレルギー性鼻炎〉 通常、成人及び12歳以上の小児にはオマリズマブ (遺伝子組換え) として1回75～600mgを2又は4週間毎に皮下に注射する。1回あたりの投与量並びに投与間隔は、初回投与前血清中総IgE濃度及び体重に基づき、投与量換算表により設定する添付文書参照

薬価

1キット 2ml 300mg 40,091円

院外限定採用

ランプレンカプセル50mg

(ノバルティスファーマ)

効能・効果

〈適応菌種〉 本剤に感性のらい菌

〈適応症〉 ハンセン病

用法・用量

[ハンセン病 (多菌型)]

通常成人には、クロファジミンとして50mgを1日1回または200～300mgを週2～3回に分割して、食直後に経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。投与期間は最低2年とし、可能であれば皮膚塗抹陰性になるまで投与すること。原則として、他剤と併用して使用すること。

[ハンセン病 (らい性結節性紅斑)]

通常成人には、クロファジミンとして100mgを1日1回、食直後に経口投与する。らい反応が安定した場合には100mgを週3回に減量する。投与期間は3ヵ月以内とする。

薬価

1カプセル 50mg 176.2円

マンジャロ皮下注アテオス10mg (日本イーライリリー)

効能・効果

2型糖尿病

用法・用量

通常、成人には、チルゼパチドとして週1回5mgを維持用量とし、皮下注射する。ただし、週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgで効果不十分な場合は、4週間以上の間隔で2.5mgずつ増量できる。ただし、最大用量は週1回15mgまでとする。

薬価

1キット 0.5ml 10mg 7,696円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。