

静岡市薬剤師会 御中

令和6年12月25日
静岡済生会総合病院 薬剤部

令和6年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和7年1月15日より処方開始となります。

院内院外採用

フリュザクラカプセル1mg・5mg (武田薬品)

効能・効果

がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

用法・用量

通常、成人にはフルキンチニブとして1日1回5mgを3週間連日経口投与し、その後1週間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価	1mg	1カプセル	5,139.40円
	5mg	1カプセル	23,866.90円

アドトラーザ皮下注300mgペン (レオファーマ)
(150mgシリンジからの切り替え)


効能・効果

既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎

用法・用量

通常、成人にはトラロキヌマブ（遺伝子組換え）として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。

薬価	300mg	2ml	1キット	41,859円
----	-------	-----	------	---------



エザルミア錠 50mg

(第一三共)

効能・効果

再発又は難治性の成人 T 細胞白血病リンパ腫

再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫

用法・用量

通常、成人にはバレメトスタットとして 200mg を 1 日 1 回空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 50mg 1錠 6,267.7円

院外限定採用

クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒

(クラシエ薬品)

効能・効果

胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、頭痛などがあるもの

用法・用量

通常、成人 1 日 7.5g を 2~3 回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

薬価 800mg 1バイアル 228,328円

レキサルティOD錠 0.5mg

(大塚製薬)

効能・効果

○統合失調症

○うつ病・うつ状態 (既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)

○アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動

用法・用量

〈統合失調症〉

通常、成人にはブレクスピプラゾールとして 1 日 1 回 1mg から投与を開始した後、4 日以上の間隔をあけて増量し、1 日 1 回 2mg を経口投与する。

〈うつ病・うつ状態 (既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)〉

通常、成人にはブレクスピプラゾールとして 1 日 1 回 1mg を経口投与する。

なお、忍容性に問題がなく、十分な効果が認められない場合に限り、
1日量2mgに増量することができる。

〈アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、
過活動又は攻撃的言動〉

通常、成人にはプレクスピプラゾールとして1日1回0.5mgか
ら投与を開始した後、1週間以上の間隔をあけて増量し、1日1回1
mgを経口投与する。

なお、忍容性に問題がなく、十分な効果が認められない場合に限り、
1日1回2mgに増量することができるが、増量は1週間以上の間
隔をあけて行うこと。

薬価	0.5mg	1錠	128.7円
----	-------	----	--------

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。