

静岡市薬剤師会 御中

令和6年10月30日  
静岡済生会総合病院 薬剤部

## 令和6年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和6年11月6日より処方開始となります。

### 院内院外採用

カチーフN錠5mg

(武田薬品)

#### 効能・効果

ビタミンK欠乏症の予防及び治療

ビタミンK欠乏が推定される出血

ビタミンK欠乏症の予防及び治療・各種薬剤(クマリン系抗凝血薬、

サリチル酸、抗生物質など) 投与中におこる低プロトロンビン血

症・胆道及び胃腸障害に伴うビタミンKの吸収障害・新生児の低プ

ロトロンビン血症・肝障害に伴う低プロトロンビン血症

ビタミンK欠乏が推定される出血

#### 用法・用量

フィトナジオンとして、通常成人1日5～15mg、新生児出血の

予防には母体に対し10mg、薬剤投与中におこる低プロトロンビン

血症等には20～50mgを分割経口投与する。なお、年齢、

症状により適宜増減する。

薬価 5mg 1錠 13.3円

クレセンバカプセル100mg

(旭化成ファーマ)

#### 効能・効果

アスペルギルス症(侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペ

ルギルス症、単純性肺アスペルギローマ) ムーコル症

クリプトコックス症(肺クリプトコックス症、播種性クリプトコッ

クス症(クリプトコックス脳髄膜炎を含む))



用法・用量

通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回200mgを1日1回経口投与する。

薬価 200mg 1カプセル 4,476.60円

ジャイパーカ錠 50mg

(日本新薬)

効能・効果

他のBTK阻害剤に抵抗性又は不耐容の再発又は難治性のマンツル細胞リンパ腫

用法・用量

通常、成人にはピルトブルチニブとして200mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 50mg 1錠 10,201.00円

セムブリックス錠 20mg

(ノバルティスファーマ)

効能・効果

前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病

用法・用量

通常、成人にはアシミニブとして1回40mgを1日2回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 20mg 1錠 5564.5円

パルモディアXR錠 0.2mg

(パルモディア錠より切り替え)  
(興和)

効能・効果

高脂血症 (家族性を含む)

用法・用量

通常、成人にはペマフィブラートとして1回0.2mgを1日1回経口投与する。ただし、トリグリセライド高値の程度により、1回0.4mgを1日1回まで増量できる。

薬価 0.2mg 1錠 60.00円

ファビハルタカプセル 200mg

(ノバルティスファーマ)

効能・効果

発作性夜間ヘモグロビン尿症

用法・用量

通常、成人にはイプタコパンとして1回200mgを1日2回経口投与する。

薬価 200mg 1カプセル 73,218.10円

#### 院外限定採用

##### イノラス配合経腸用液

###### 効能・効果

一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。

###### 用法・用量

通常、成人標準量として1日562.5～937.5mL(900～1,500kcal)を経管又は経口投与する。経管投与の投与速度は50～400mL/時間とし、持続的又は1日数回に分けて投与する。経口投与は1日1回又は数回に分けて投与する。なお、年齢、体重、症状により投与量、投与速度を適宜増減する。

薬価 187.5ml 1パック 264.38円

##### ターゼナカプセル0.25mg、1mg

###### 効能・効果

BRCA 遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌  
がん化学療法歴のあるBRCA 遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

###### 用法・用量

BRCA 遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌  
エンザルタミドとの併用において、通常、成人にはタラゾパリブとして1日1回0.5mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

がん化学療法歴のあるBRCA 遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

通常、成人にはタラゾパリブとして1日1回1mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する

薬価 0.25mg 1カプセル 9,576.0円  
1mg 1カプセル 21,547.1円

## トルカブ錠160mg、200mg

### 効能・効果

内分泌療法後に増悪したPIK3CA、AKT1又はPTEN遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

### 用法・用量

フルベストラントとの併用において、通常、成人にはカピバセルチブとして1回400mgを1日2回、4日間連続して経口投与し、その後3日間休薬する。

これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価	160mg	1錠	9,263.5円,
	200mg	1錠	11,244.3円

## ビオスリー配合錠

### 効能・効果

腸内菌叢の異常による諸症状の改善

### 用法・用量

通常成人1日3～6錠を3回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

薬価	1錠	6.6円
----	----	------

## アピドラ注100単位/mL

### 効能・効果

インスリン療法が適応となる糖尿病

### 用法・用量

通常、成人では1回2～20単位を毎食直前に皮下注射するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤と併用することがある。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて適宜増減するが、中間型又は持効型溶解インスリン製剤の投与量を含めた維持量としては通常1日4～100単位である。必要に応じポータブルインスリン用輸液ポンプを用いて投与する。

薬価	10ml	1バイアル	2,520円
----	------	-------	--------

## ブイタマークリーム

### 効能・効果

アトピー性皮膚炎

尋常性乾癬

### 用法・用量

アトピー性皮膚炎

通常、成人及び12歳以上の小児には、1日1回、適量を患部に塗布する。

尋常性乾癬

通常、成人には、1日1回、適量を患部に塗布する。

薬価 15g 1本 4,512円

## ル・エストロジェル0.06%

### 効能・効果

更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経症状 (Hot flush 及び発汗)

生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整

凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期

### 用法・用量

更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経症状 (Hot flush 及び発汗)

通常、成人に対しル・エストロジェル2プッシュ (1.8g、エストラジオールとして1.08mg含有) を1日1回、両腕の手首から肩までの広い範囲に塗擦する。なお、症状に応じて、適宜減量する。減量する場合は、ル・エストロジェル1プッシュ (0.9g、エストラジオールとして0.54mg含有) を1日1回、両腕の手首から肩までの広い範囲に塗擦する。

生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整

通常、ル・エストロジェル1又は2プッシュ (0.9又は1.8g、エストラジオールとして0.54又は1.08mg含有) を1日1回、21～28日間、両腕の手首から肩までの広い範囲に塗擦し、投与期間の後半に黄体ホルモン剤を併用する。

凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期

通常、ル・エストロジェル2～10プッシュ (1.8～9.0g、エストラジオールとして1.08～5.40mg含有) を1日1回、両腕の手首から肩、腹部、大腿部及び腰部の広い範囲に塗擦

し、子宮内膜の十分な肥厚が得られた時点で、黄体ホルモン剤の併用を開始して、妊娠 8 週まで本剤の投与を継続する。

薬価 80g 1本 1,616円

#### クラシエ補中益気湯エキス細粒

##### 効能・効果

元気がなく胃腸のはたらきが衰えて疲れやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ

##### 用法・用量

通常、成人 1日 7.5g を 2~3 回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

薬価 3.75g 1包 76.5円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。