

静岡市薬剤師会 御中

令和6年8月30日  
静岡済生会総合病院 薬剤部

## 令和6年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和6年9月4日より処方開始となります。

### 院外限定採用

エナロイ錠 2mg、4mg (鳥居)

効能・効果

腎性貧血

用法・用量

<保存期慢性腎臓病患者及び腹膜透析患者>

通常、成人には、エナロデュスタットとして1回2mgを開始用量とし、1日1回食前又は就寝前に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回8mgとする。

<血液透析患者>

通常、成人には、エナロデュスタットとして1回4mgを開始用量とし、1日1回食前又は就寝前に経口投与する。

薬価            2mg        1錠            254.30円

                  4mg        1錠            461.70円


レイボー錠 50mg (日本イーライリリー)

効能・効果

片頭痛

用法・用量

通常、成人にはラスミジタンとして1回100mgを片頭痛発作時に経口投与する。ただし、患者の状態に応じて1回50mg又は200mgを投与することができる。頭痛の消失後に再発した場合は、24時間あたりの総投与量が200mgを超えない範囲で再投与で



きる。

薬価 50mg 1錠 324.7円

アリドネパッチ27.5mg、55mg

効能・効果

アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

用法・用量

通常、軽度～中等度のアルツハイマー型認知症患者にはドネペジルとして、1日1回27.5mgを貼付する。高度のアルツハイマー型認知症患者にはドネペジルとして、27.5mgで4週間以上経過後、55mgに増量する。なお、症状により1日1回27.5mgに減量できる。

本剤は背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。

薬価 27.5mg 1枚 286.40円  
55mg 1枚 437.60円

アレジオン眼瞼クリーム0.5%

効能・効果

アレルギー性結膜炎

用法・用量

通常、適量を1日1回上下眼瞼に塗布する。

薬価 0.5% 2g 1本 3373.4円

ミニトロテープ27mg (杏林)

効能・効果

狭心症

用法・用量

通常、成人に対し1日1回1枚(ニトログリセリンとして27mg含有)を胸部、腰部、上腕部のいずれかに貼付する。

なお、効果不十分の場合は2枚に増量する。

薬価 27mg 1枚 51.90円

ミリステープより切り替えます。

以下の医薬品は、院内在庫消尽後削除になります。

### 令和6年度前期削除品目リスト

削除薬品	一般名	効能・効果	同効薬(備考)
クロルマジン酢酸エステル錠 25mg「タイヨー」(製造中止)	クロルマジン酢酸 エステル	前立腺肥大症 前立腺癌 但し、転移のあ る前立腺癌症例に対しては、他療法によ る治療の困難な場合に使用する。	シロドシンOD錠4mg、タダラフィル錠5mg ZA、タムスロシン塩酸円OD錠0.2mg デュタステ リドカプセル0.5mg AV、ナフトピジルOD錠50 mg等、カソデックスOD錠、アーリーダ錠、イ クスタンジ錠、エストラサイトカプセル、オダイ ン錠、ザイティガ錠等
デジレル錠25 (製造中止)	トラゾドン塩酸塩	うつ病・うつ状態	その他の抗うつ剤
ユニフィルLA錠200mg (製 造中止)	テオフィリン	気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫	ネオフィリン錠100mg、テオドール50mg、テ オフィリン徐放ドライシロップ小児用20%、テ オロング錠100mg
ミリステープ5mg (製造中 止)	ニトログリセリン	狭心症、急性心不全(慢性心不全の急)	ミニトロテープ27mgを採用します

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。