

静岡市薬剤師会 御中

令和4年5月30日
静岡済生会総合病院 薬剤科

令和4年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和4年6月8日より処方開始となります。

院内院外採用

ボンベンディ静注用1300（武田薬品工業株式会社）

効能・効果

von Willebrand病患者における出血傾向の抑制

用法・用量

本剤を添付の溶解液10mLで溶解し、4mL/分を超えない速度で緩徐に静脈内に注射する。通常、18歳以上の患者には、体重1kg当たり40～80国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。

薬価 1バイアル 146,288円

院外限定採用


ゾーミッグRM錠2.5mg（沢井製薬株式会社）

効能・効果

片頭痛

用法・用量

通常、成人にはゾルミトリプタンとして1回2.5mgを片頭痛の頭痛発現時に経口投与する。なお、効果が不十分な場合には、追加投与をすることができるが、前回の投与から2時間以上あけること。ま



た、2.5mgの経口投与で効果が不十分であった場合には、次回片頭痛発現時から5mgを経口投与することができる。

ただし、1日の総投与量を10mg以内とすること。

薬価 1カプセル 574.20円

タズベリク錠200mg (エーザイ株式会社)

効能・効果

再発又は難治性のEZH2遺伝子変異陽性の濾胞性リンパ腫(標準的な治療が困難な場合に限る)

用法・用量

通常、成人にはタゼメトスタットとして1回800mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 1錠 3,004.60円

ベタナミン錠50mg ((株)三和化学研究所)

効能・効果

次の疾患に伴う睡眠発作、傾眠傾向、精神的弛緩の改善
ナルコレプシー、ナルコレプシーの近縁傾眠疾患

用法・用量

軽症うつ病、抑うつ神経症にはペモリンとして通常成人1日10~30mgを朝食後経口投与する。

ナルコレプシーの近縁傾眠疾患にはペモリンとして通常成人1日20~200mgを朝食後、昼食後の2回に分割経口投与する。

薬価 1錠 41.10円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しくお願いいたします。