

静岡市薬剤師会 御中

令和5年6月30日  
静岡済生会総合病院 薬剤科

## 令和5年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和4年7月5日より処方開始となります。

### 院内院外採用

ソマトロピン BS 皮下注 10mg 「サンド」 シュアパル（サンド株式会社）

#### 効能・効果

骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症  
骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長  
ターナー症候群、慢性腎不全、プラダーウィリー症候群  
成人成長ホルモン分泌不全症（重症に限る）  
骨端線閉鎖を伴わない SGA（small-for-gestational age）性低身長症

#### 用法・用量


骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症  
通常1週間に体重 kg 当たり、ソマトロピン（遺伝子組換え）として0.175mg を6～7回に分けて皮下に注射する。

骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長

ターナー症候群：通常1週間に体重 kg 当たり、ソマトロピン（遺伝子組換え）として0.35mg を6～7回に分けて皮下に注射する。

慢性腎不全：通常1週間に体重 kg 当たり、ソマトロピン（遺伝子組換え）として0.175mg を6～7回に分けて皮下に注射するが、投与開始6ヵ月後以降増量基準に適合した場合は0.35mg まで増量することができる。

プラダーウィリー症候群：通常1週間に体重 kg 当たり、ソマトロピン（遺伝子組換え）として0.245mg を6～7回に分けて皮下に



注射する。

成人成長ホルモン分泌不全症（重症に限る）

通常開始用量として、1週間に体重 kg 当たり、ソマトロピン（遺伝子組換え）として0.021mgを6～7回に分けて皮下に注射する。患者の臨床症状に応じて1週間に体重 kg 当たり0.084mgを上限として漸増し、1週間に6～7回に分けて皮下に注射する。なお、投与量は臨床症状及び血清インスリン様成長因子-I（IGF-I）濃度等の検査所見に応じて適宜増減する。ただし、1日量として1mgを超えないこと。

骨端線閉鎖を伴わないSGA（small-for-gestational age）性低身長症

通常1週間に体重 kg 当たり、ソマトロピン（遺伝子組換え）として0.23mgを6～7回に分けて皮下に注射する。なお、効果不十分な場合は1週間に体重 kg 当たり0.47mgまで増量し、6～7回に分けて皮下に注射する

薬価 10mg、カートリッジ 26,724円

## 院外限定採用薬

ラジカット内用懸濁液2.1%（田辺三菱製薬）

効能・効果

筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制

用法・用量

通常、成人に1回5mL（エダラボンとして105mg）を空腹時に1日1回経口投与する。

通常、本剤投与期と休薬期を組み合わせた28日間を1クールとし、これを繰り返す。第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休薬し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休薬する。

薬価 1ml 2751.90円（田辺三菱製薬）

効能・効果

筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制

用法・用量

通常、成人に1回5mL（エダラボンとして105mg）を空腹時に1日1回経口投与する。

通常、本剤投与期と休薬期を組み合わせた28日間を1クールとし、こ

れを繰り返す。第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休薬し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休薬する。

薬価 1ml 2751.90円

製品 第1クール用35ml瓶と第2クール用50ml瓶があります。

#### アポハイドローション20% (久光製薬)

効能・効果

原発性手掌多汗症

用法・用量

1日1回、就寝前に適量を両手掌全体に塗布する。

薬価 1g 545.80円

製品 1本 4.5ml製品ですが。

薬価がg当たりの薬価で1本が4.32gになります。

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。