



事務連絡
2024年10月23日

職員各位

薬事委員会
委員長 水野伸一

薬事委員会 会議結果報告

2024年10月16日に開催された薬事委員会での審議結果を報告いたします。

1. 検査試薬のイムノキャッチ Strep Aを採用する。
2. 別記載の医薬品3品目3規格と後発医薬品1品目2規格を採用医薬品に追加する。
3. 別記載の医薬品8品目8規格を院外処方限定医薬品に登録する。
4. 別記載の医薬品3品目3規格を削除する。

以上

2024年10月院外処方限定医薬品

- ・アサコール錠400mg
- ・アレグラ錠60mg
- ・アムロジピン錠10mg
- ・フルタイド100ディスカス
- ・KB-26クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒
- ・KB-48クラシエ十全大補湯エキス細粒
- ・KB-16クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒
- ・EK-230太虎堂芍帰調血飲エキス顆粒

2024年10月削除薬品一覧表

薬効分類

2343 アルミニウム化合物製剤
1172 精神神経用剤
1319i 眼科用剤

薬品名(削除理由:特に記載なければ処方頻度減少による)

アドソルビン原末(販売中止)
ヒルナミン筋注25mg(販売中止)
ミケラン点眼液2%



新規採用医薬品

<p>アレジオン眼薬クリーム0.5%2g 参天 1319i 成分:エピナスチン塩酸塩</p>	<p>効能 用法 貯法</p>	<p>抗アレルギー剤(アレルギー性結膜炎) 1日1回、適量を上下眼瞼に塗布 室温</p>
<p>エムラクリーム 劇 佐藤製薬 1219 成分:リドカイン・プロピトカイン 《禁忌》メトヘモグロビン血症(悪化のおそれ)。本剤成分又はアミト局所麻酔剤に過敏症の既往歴。</p>	<p>効能 用法 副作用 貯法</p>	<p>皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和、注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和 成人:レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10cm²あたり1gを密封法(ODT)により60分間塗布する。1回あたりの塗布量は10gまで、塗布時間は120分を超えないこと。 小児:レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10cm²あたり1gを密封法(ODT)により60分間塗布する。1回あたりの塗布量及び塗布時間は以下を超えないこと。 0～2ヶ月:最大塗布量1g、最大塗布時間60分、 3～11ヶ月(体重5kg以下):最大塗布量1g、最大塗布時間60分、 3～11ヶ月(体重5kg超):最大塗布量2g、最大塗布時間60分、 1～14歳(体重5kg以下):最大塗布量1g、最大塗布時間60分、 1～14歳(体重5kg超10kg以下):最大塗布量2g、最大塗布時間120分、 1～14歳(体重10kg超):最大塗布量10g、最大塗布時間120分、 《重大な副作用》ショック、アナフィラキシー、意識障害、振戦、痙攣、メトヘモグロビン血症[不明] 室温</p>
<p>手ピカジェル ノンアルコール 健栄 2619 成分:塩化ベンザルコニウム塩化物 《禁忌》損傷のある皮膚、目の周囲、粘膜等(悪化、刺激作用)。</p>	<p>効能 用法 貯法</p>	<p>手指の殺菌・消毒 適量を手掌にとり、乾燥するまで摩擦 室温</p>

新規採用後発医薬品

<p>エスワンタイホウ配合OD錠T20、T25 劇 大鵬 4229J 成分:テガフル、ギメラシル、オテラシルカリウム 《禁忌》本剤成分に重篤な過敏症の既往歴。重篤な骨髓抑制(増強)、重篤な腎障害(排泄遅延)、重篤な肝障害(悪化)、他のフッ化ピリジン系抗悪性腫瘍剤(併用療法含む)・フルボリン投与中(副作用増強)、妊婦又はその可能性(催奇形性)。</p>	<p>効能 用法 警告 副作用</p>	<p>代謝拮抗剤(胃癌:A/B/C法、結腸・直腸癌:A/C/D法、頭頸部癌:A法、非小細胞肺癌:A/B/C法、手術不能又は再発乳癌:A法、膵癌:A/C法、胆道癌:A/E/F法、a)ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法) (A法からE法)初回投与量を体表面積に合わせ次の基準量とし、 体表面積1.25m²未満→初回基準量40mg/回(1日80mg) 1.25m²以上～1.5m²未満→初回基準量50mg/回(1日100mg) 1.5m²以上→初回基準量60mg/回(1日120mg) (A法)1日2回朝夕食後28日間連日、その後14日間休薬、これを1クールとし繰り返す。 (B法)1日2回朝夕食後21日間連日、その後14日間休薬、これを1クールとし繰り返す。 (C法)1日2回朝夕食後14日間連日、その後7日間休薬、これを1クールとし繰り返す。 (D法)1日2回朝夕食後14日間連日、その後14日間休薬、これを1クールとし繰り返す。 (E法)1日2回朝夕食後7日間連日、その後7日間休薬、これを1クールとし繰り返す。 (F法)初回投与量を体表面積に合わせ次の基準量とし、 体表面積1.25m²未満→初回基準量:朝40mg/回、夕20mg/回(1日60mg) 1.25m²以上～1.5m²未満→初回基準量40mg/回(1日80mg) 1.5m²以上→初回基準量50mg/回(1日100mg) 1日2回朝夕食後14日間連日、その後7日間休薬、これを1クールとし繰り返す。 a)内分泌療法剤との併用において、初回投与量を体表面積に合わせ次の基準量とし、 体表面積1.25m²未満→初回基準量40mg/回(1日80mg) 1.25m²以上～1.5m²未満→初回基準量50mg/回(1日100mg) 1.5m²以上→初回基準量60mg/回(1日120mg) 1日2回朝夕食後14日間連日、その後7日間休薬、これを1クールとし最長1年間繰り返す。 警告 《本剤を含む癌化学療法は緊急時に十分対応できる医療施設において十分な知識・経験を持つ医師の元、適切と判断される症例にのみ実施。患者の選択には各併用薬剤の添付文書を参照し十分注意。開始前に有効性・危険性を十分説明し同意を得る事。5-FUとは投与制限毒性が骨髓抑制という点で異なり、特に臨床検査値に十分注意。劇症肝炎等の重篤な肝障害あり、定期的に肝機能検査を行う事。他のフッ化ピリジン系抗悪性腫瘍剤、これらの薬剤との併用、フルボリンとの併用により重篤な血液障害等が発現。添付文書を熟読する事》 副作用 《重大な副作用》骨髓抑制(汎血球減少、無顆粒球症:白血球減少[46.7%]、血小板減少[15.7%])、溶血性貧血、劇症肝炎等の重篤な肝障害(B型肝炎ウイルスの再活性化によるもの含む)、脱水症状、心筋梗塞、狭心症、不整脈、心不全、重篤な口内炎、消化管穿孔、急性腎障害、ネフローゼ症候群、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死融解症(TEN)、白質脳症等を含む精神神経障害、急性膵炎、横紋筋融解症、嗅覚脱失、涙道閉塞、肝硬変[不明]、DIC[0.4%]、間質性肺炎[0.3%]、重篤な腸炎[0.5%]、消化管潰瘍[0.5%]、消化管出血[0.3%]、嗅覚障害[0.1%]。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

整理医薬品在庫表(2024/10/9現在)

整理医薬品在庫表(2024/10/9現在)								
内服	現在庫量	単位	包装量	薬価単位	薬価	総額薬価	薬効分類	備考
	1 ドレニゾンテープ	21	枚	1	枚	62.60	1,314.6	副腎皮質ホルモン製剤
						1,314.6	①内服合計	