

静岡市薬剤師会 御中

令和5年10月30日
静岡済生会総合病院 薬剤部

令和5年度 採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和4年11月8日より処方開始となります。

院内院外採用

ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター (旭化成ファーマ)

効能・効果

既存治療で効果不十分な関節リウマチ

効能又は効果に関連する注意

過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与すること。

用法・用量

通常、成人にはサリルマブ（遺伝子組換え）として1回200mgを2週間隔で皮下投与する。なお、患者の状態により1回150mgに減量すること。

薬価 200mg 1キット 47,958円

院外限定採用

リットフーロカプセル 50mg (ファイザー製薬)


効能・効果

円形脱毛症（ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る）

用法・用量

通常、成人及び12歳以上の小児には、リトレンチニブとして50mgを1日1回経口投与する。

薬価 50mg 1カプセル 5,802.40円



エプクルーサ配合錠

(ギリアド・サイエンシズ)

効能・効果

C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変又はC型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

用法・用量

〈未治療又は前治療歴のないC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善〉

〈C型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善〉

通常、成人には、1日1回1錠（ソホスブビルとして400mg及びベルパタスビルとして100mg）を12週間経口投与する。

〈前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善〉

リバビリンとの併用において、通常、成人には、1日1回1錠（ソホスブビルとして400mg及びベルパタスビルとして100mg）を24週間経口投与する。

薬価 1錠 61,157.8円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。