

静岡市薬剤師会 御中

令和5年8月29日
静岡済生会総合病院 薬剤部

令和5年度 採用・削除のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和4年9月6日より処方開始となります。削除品につきましては、院内在庫消尽後に削除となります。

院内院外採用

ヴァンプリタ錠 17.7mg、26.5mg (第一三共)

効能・効果

FLT3-ITD変異陽性の急性骨髄性白血病

用法・用量

〈未治療の FLT3-ITD 変異陽性の急性骨髄性白血病〉

通常、成人には寛解導入療法としてシタラビン及びアントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤との併用において、地固め療法としてシタラビンとの併用において、キザルチニブとして1日1回35.4mgを2週間経口投与し、寛解導入療法及び地固め療法の投与サイクル数に応じて投与を繰り返す。その後、維持療法として、キザルチニブとして1日1回26.5mgを2週間経口投与し、それ以降は1日1回53mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

〈再発又は難治性の FLT3-ITD 変異陽性の急性骨髄性白血病〉

通常、成人にはキザルチニブとして1日1回26.5mgを2週間経口投与し、それ以降は1日1回53mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する

薬価	17.7mg	1錠	20,059.6円
	26.5mg	1錠	27,074.4円

タリージェ OD錠 2.5mg 5mg 10mg 15mg (第一三共)

普通錠からの切り替え



効能・効果

神経障害性疼痛

用法・用量

通常、成人には、ミロガバリンとして初期用量1回5mgを1日2回経口投与し、その後1回用量として5mgずつ1週間以上の間隔をあけて漸増し、1回15mgを1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により1回10mgから15mgの範囲で適宜増減し、1日2回投与する。

薬価	2. 5 m g	1錠	67. 2円
	5 m g	1錠	92. 5円
	10 m g	1錠	127. 9円
	15 m g	1錠	154. 8円

リフヌア錠45mg (杏林製薬)

効能・効果

難治性の慢性咳嗽

用法・用量

通常、成人にはゲーファピキサントとして1回45mgを1日2回経口投与する。

薬価	1錠	203. 2円
----	----	---------

院外限定採用薬

エビリファイ内用液0. 1% (大塚製薬)

効能・効果

- ①統合失調症
- ②双極性障害における躁症状の改善
- ③うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）
- ④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性

用法・用量

- ①統合失調症エビリファイ内用液：通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mg（6～12mL）を開始用量、1日6～24mg（6～24mL）を維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mg（30mL）を超えないこと。
- ②双極性障害における躁症状の改善エビリファイ内用液：通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mg（12～24mL）を1日1回経口投

与する。なお、開始用量は24mg (24mL) とし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mg (30mL) を超えないこと。

③うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）エビリファイ内用液：通常、成人にはアリピプラゾールとして3mg (3mL) を1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として3mg (3mL) とし、1日量は15mg (15mL) を超えないこと。

④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性エビリファイ内用液：通常、アリピプラゾールとして1日1mg (1mL) を開始用量、1日1～15mg (1～15mL) を維持用量とし、1日1回経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として最大3mg (3mL) とし、1日量は15mg (15mL) を超えないこと。

薬価 1mg/1ml 1包 43.6円

注意 1ml (1mg) 単位のみ処方になります。

ケレンディア錠10mg、20mg (バイエル薬品)

効能・効果

2型糖尿病を合併する慢性腎臓病

ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。

用法・用量

通常、成人にはフィネレノンとして以下の用量を1日1回経口投与する。

eGFRが60mL/min/1.73m²以上：20mg

eGFRが60mL/min/1.73m²未満：10mgから投与を開始し、血清カリウム値、eGFRに応じて、投与開始から4週間後を目安に20mgへ増量する。

薬価 10mg 1錠 149.1円

20mg 1錠 213.1円

タブネオスカプセル10mg (キッセイ薬品)

効能・効果

顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症

用法・用量

通常、成人にはアバコパンとして1回30mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。

薬価 10mg 1カプセル 1403.90円

削除品は、別添資料参照

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しくお願いいたします。

令和5年度削除品目リスト

削除対象薬品	一般名	効能・効果	同効薬(備考)
エクセラーゼ 配合錠 (製造販売中止)	サナクターゼ Mメイ セラーゼ プロクターゼ オリパーゼ 2S	消化異常症状の改善	なし
キョウニン水	キョウニン水	急性気管支炎に伴う咳嗽及び 喀痰喀出困難	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg、カルボ システイン錠500mg、ムコダインDS5 0%、ムコダインシロップ小児用5%
ビソルボン吸入液0.2% (製造販売中止)	ブロムヘキシン塩酸	急性気管支炎、肺炎、肺結核	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg、カルボ システイン錠500mg、ムコダインDS5 0%、ムコダインシロップ小児用5%