

静岡市薬剤師会 御中

令和6年2月29日  
静岡済生会総合病院 薬剤部

## 令和5年度 採用・削除のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和6年3月13日より処方開始となります。

### 院内院外採用

レボカルニチンFF内用液10%分包5ml「トーワ」

効能・効果

カルニチン欠乏症

用法・用量

通常、成人には、レボカルニチンとして、1日1.5～3g（15～30ml）を3回に分割経口投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。

通常、小児には、レボカルニチンとして、1日体重1kgあたり25～100mg（0.25～1ml）を3回に分割経口投与する。

なお、患者の状態に応じて適宜増減する。

薬価 500mg 5ml 137.3円


塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 （用時購入品）

効能・効果

- ・悪性リンパ腫（ホジキン病、細網肉腫、リンパ肉腫）
- ・以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法  
悪性星細胞腫、乏突起膠腫成分を有する神経膠腫

用法・用量

通常成人では、プロカルバジンとして1日50mg～100mg（1～2カプセル）を1～2回に分割して経口投与を開始する。その後約1週間以内に漸増し、プロカルバジンとして1日150mg～300mg（3～6カプセル）を3回に分割投与し、臨床効果が明らかとなるまで連日投与する。



悪性リンパ腫の寛解導入までに要する総投与量は、プロカルバジンとして通常5～7gである。

薬価 50mg 1錠 622.2円

#### コレチメント錠9mg

##### 効能・効果

活動期潰瘍性大腸炎（重症を除く）

##### 用法・用量

通常、成人にはブデソニドとして9mgを1日1回経口投与する。

薬価 9mg 1錠 607.8円

#### シルデナフィル錠20mgRE「JG」

##### 効能・効果

肺動脈性肺高血圧症

##### 用法・用量

成人に通常、シルデナフィルとして1回20mgを1日3回経口投与する。

薬価 20mg 1錠 408.80円

#### メラトベル顆粒小児用

##### 効能・効果

小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善

##### 用法・用量

通常、小児にはメラトニンとして1日1回1mgを就寝前に経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日1回4mgを超えないこと。

薬価 1g 207.8円

#### ルマケラス錠120mg

##### 効能・効果

がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

##### 用法・用量

通常、成人にはソトラシブとして960mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 120mg 1錠 4,204.3円

### ベピオローション

効能・効果

尋常性ざ瘡

用法・用量

1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布する

薬価 15g 1本 1,471.5円

### アジヨビ皮下注 225mg オートインジェクター (用時購入品)

効能・効果

片頭痛発作の発症抑制

用法・用量

通常、成人にはフレマネズマブ（遺伝子組換え）として4週間に1回225mgを皮下投与する、又は12週間に1回675mgを皮下投与する。

薬価 225mg 1.5ml 1本 39,090円

### オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg (用時購入品)

効能・効果

片頭痛発作の発症抑制

用法・用量

通常、成人にはフレマネズマブ（遺伝子組換え）として4週間に1回225mgを皮下投与する、又は12週間に1回675mgを皮下投与する。

注意事項

初回のみ専用注入器を渡すため注入器加算をとり院内処方にてご処方ください、

次回からのカートリッジ、針については院外処方が可能です。

薬価 1.5mg 0.75ml 1筒 16,128円

### ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター (用時購入品)

効能・効果

既存治療で効果不十分な関節リウマチ

用法・用量

通常、成人にはオゾラリズマブ（遺伝子組換え）として1回30mgを4週間の間隔で皮下投与する。

薬価 30mg 0.375ml 1本 113,858円

## 院外限定採用

エビリファイ内用液0.1% 6ml分包装

### 効能・効果

- ①統合失調症
- ②双極性障害における躁症状の改善
- ③うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）
- ④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性

### 用法・用量

#### 〈統合失調症〉

通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。

#### 〈双極性障害における躁症状の改善〉

通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。

#### 〈うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る）〉

通常、成人にはアリピプラゾールとして3mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。

#### 〈小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性〉

通常、アリピプラゾールとして1日1mgを開始用量、1日1～15mgを維持用量とし、1日1回経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として最大3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。

薬価 6mg 6ml 1包 262.8円

下記の品目について、病院内在庫がなくなり次第削除になります。

### 令和5年度後期削除品目リスト

削除対象薬品	一般名	効能・効果	同効薬(備考)
硫酸アトロピン 「ホエイ」	アトロピン硫酸 塩水和物	経口用剤として 胃・十二指腸潰瘍における 分泌ならびに運動亢進、胃腸の痙攣性疼 痛、痙攣性便秘、胆管・尿管の痙攣、有機 リン系殺虫剤・副交感 神経興奮剤の中毒、 迷走神経性徐脈及び迷走神経性房室伝導障 害 夜尿症、その他の徐脈及び房室伝導障害 非薬物性パーキンソニズム 麻酔前投薬 眼 科用剤として 診断または治療を目的とする 散瞳と調節麻痺	
ヒスロン錠5	メドロキシプロ ゲステロン酢酸 エステル	無月経、月経周期異常(稀発月経、多発月 経)又は生殖補助医 療における調節卵巢刺 激の開始時期の調整、月経量異常(過 少月 経、過多月経)、機能性子宮出血、黄体機 能不全による 不妊症、切迫流早産、習慣性 流早産、調節卵巢刺激下におけ る早発排卵 の防止	デュファストン 錠5mg、ルト ラール錠2mg
フェルムカプセ ル100mg	フマル酸第一鉄	鉄欠乏性貧血	クエン酸第一鉄 Na錠50mg 「サワイ」
【般】フルバス タチン錠 20mg	フルバスタチン ナ トリウム	○高コレステロール血症 ○家族性高コレス テロール血症	アトルバスタチ ン錠5mg、10m g、リボバス5 mg、ピタバス タチンCa・O D錠2mg、プ ラバスタチンN a塩錠10m g、クレストー ルOD錠2.5 mg、5mg
ドレニゾンテー プ4μg/cm <sup>2</sup>	リフルドロキシ コルチド	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ピダ ー ル苔癬を含む)、結節 性痒疹(固定蕁麻疹を 含む)、乾癬、掌蹠膿疱症、扁平紅色苔癬、 アミロイド苔癬、環状肉芽腫、光沢苔癬、 慢性円板状エリテマトー デス、フォック ス・フォアダイス病、肥厚性瘢痕・ケロイ ド、尋常性白斑、シャンパーグ病、悪性リ ンパ腫(菌状息肉症の紅斑・ 扁平浸潤期な ど)	エクラープラス ター20μg/ cm <sup>2</sup>

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。