

静岡市薬剤師会 御中

令和5年5月31日  
静岡済生会総合病院 薬剤科

## 令和5年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和4年6月7日より処方開始となります。

### 院内院外採用

タバリス錠100mg (キッセイ薬品工業株式会社)

#### 効能・効果

慢性特発性血小板減少性紫斑病

以下の場合で、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に投与すること。

- ・他の治療にて十分な効果が得られない場合、又は忍容性に問題があると考えられる場合
- ・血小板数、臨床症状からみて出血リスクが高いと考えられる場合

#### 用法・用量

通常、成人には、ホスタマチニブとして初回投与量100mgを1日2回、経口投与する。初回投与量を4週間以上投与しても目標とする血小板数の増加が認められず、安全性に問題がない場合は150mgを1日2回に増量する。なお、血小板数、症状に応じて適宜増減するが、最高投与量は1回150mgを1日2回とする。

#### 薬価

100mg 1錠 4,188円



マンジャロ皮下注 アテオス 2.5mg 5mg アテオス  
(田辺三菱製薬株式会社)

効能・効果

2型糖尿病

用法・用量

通常、成人には、チルゼパチドとして週1回5mgを維持用量とし、皮下注射する。ただし、週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgで効果不十分な場合は、4週間以上の間隔で2.5mgずつ増量できる。ただし、最大用量は週1回15mgまでとする。

薬価

2.5mg	1筒	1,924円
5mg	1筒	3,848円

院外限定採用薬

カログラ錠120mg (キッセイ薬品工業株式会社)

効能・効果

中等症の潰瘍性大腸炎(5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限る)

用法・用量

通常、成人にはカロテグラストメチルとして1回960mgを1日3回食後経口投与する。

薬価

120mg	1錠	200円
-------	----	------

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg, 30mg「フジモト」  
(藤本製薬株式会社)

この2剤ですが、処方時は、一般名処方となり以下の表記となります。

【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg (12時間持続)

【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒30mg (12時間持続)

効能・効果

激しい疼痛を伴う各種癌における鎮痛

用法・用量

モルヒネ硫酸塩水和物として、通常、成人1日20～120mgを2回に分割経口投与する。なお、初回量は10mgとすることが望ましい。症状に応じて適宜増減する。

薬価

10mg	1包	200.10円
30mg	1包	528.30円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いたします。