

静岡市薬剤師会 御中

令和5年1月27日  
静岡済生会総合病院 薬剤科

## 令和4年度 臨時採用のご案内

いつもお世話になっております。臨時採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和5年2月8日より処方開始となります。

### 院内院外採用

ウブトラビ錠0.2mg (日本新薬株式会社)

効能・効果

肺動脈性肺高血圧症

外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症

用法・用量

通常、成人にはセレキシパグとして1回0.2mgを1日2回食後経口投与から開始する。忍容性を確認しながら、7日以上の間隔で1回量として0.2mgずつ最大耐用量まで増量して維持用量を決定する。なお、最高用量は1回1.6mgとし、いずれの用量においても、1日2回食後に経口投与する。

薬価 1錠 1460.3円

ノクサフィル錠100mg (MSD株式会社)

効能・効果

造血幹細胞移植患者又は好中球減少が予測される血液悪性腫瘍患者における深在性真菌症の予防

下記の真菌症の治療

侵襲性アスペルギルス症、フサリウム症、ムーコル症、コクシジオイデス症、クロモブラストミコーシス、菌腫

用法・用量



通常成人にはボサコナゾールとして初日は1回300mgを1日2回、2日目以降は300mgを1日1回経口投与  
薬価 1錠 3,003.8円

#### 院外限定採用

オルミエント錠4mg (日本イーライリリー株式会社)

#### 効能・効果

既存治療で効果不十分な下記疾患

関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む)

アトピー性皮膚炎

SARS-CoV-2による肺炎 (ただし、酸素吸入を要する患者に限る)

円形脱毛症 (ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)

#### 用法・用量

〈関節リウマチ、アトピー性皮膚炎、円形脱毛症〉

通常、成人にはバリシチニブとして4mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態に応じて2mgに減量すること。

〈SARS-CoV-2による肺炎〉

通常、成人にはレムデシビルとの併用においてバリシチニブとして4mgを1日1回経口投与する。なお、総投与期間は14日間までとする。

薬価 1錠 5274.9円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しくお願ひいたします。