

静岡市薬剤師会 御中

令和7年10月30日
静岡済生会総合病院 薬剤部

令和7年度 採用のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和7年11月5日より処方開始となります。

院内院外採用

テプミトコ錠 250mg (用時購入品)

効能・効果

MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の
非小細胞肺癌

用法・用量

通常、成人にはテポチニブ塩酸塩水和物として1回 500mg を1日1回食
後に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 1錠 250mg 14,399円

ドプテレット錠 20mg (用時購入品)

効能・効果

待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少
症の改善

持続性及び慢性免疫性血小板減少症

用法・用量


〈待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少
症の改善〉

通常、成人には、アバロンボパグとして以下の要領を1日1回、5
日間食後に経口投与する。

投与開始の血小板数が 40,000/ μ L 以上 50,000/ μ L 未満：40mg

投与開始の血小板数が 40,000/ μ L 未満：60mg

〈持続性及び慢性免疫性血小板減少症〉



通常、成人には、アバロンボパグとして初回投与量 20mg を 1 日 1 回、食後に経口投与する。投与開始後、血小板数、症状に応じて用法・用量を適宜調整する。また、最高投与量は 40mg を 1 日 1 回とする。

薬価 1錠 20mg 7,106.6円

ラズクルーズ錠 80mg (用時購入品)

効能・効果

EGFR 遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

用法・用量

アミバンタマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはラゼルチニブとして 240mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 1錠 80mg 4,403.3円

ティブソボ錠 250mg (用時購入品)

効能・効果

IDH1 遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病

用法・用量

アザシチジンとの併用において、通常、成人にはイボシデニブとして 1 日 1 回 500mg を経口投与する。

なお、患者の状態により適宜減量する。

薬価 1錠 250mg 30,007円

院内限定採用

ハルロピテープ 8mg、32mg

効能・効果

パーキンソン病

用法・用量

通常、成人にはロピニロール塩酸塩として 1 日 1 回 8mg から始め、以後経過を観察しながら、必要に応じて 1 週間以上の間隔で、1 日量として 8mg ずつ増量する。いずれの投与量の場合も 1 日 1 回、胸部、腹部、側腹部、大腿部又は上腕部のいずれかの皮膚に貼付し、24 時間毎に貼り替える。なお、年齢、症状により適宜増減するが、ロピニロール塩酸塩として 1 日量 64mg を超えないこととする。

薬価 1枚 8mg 287.6円

1 枚 3 2 m g

6 9 4 . 3 円

ピマリシン点眼液 5 % 「センジュ」

効能・効果

角膜真菌症

用法・用量

用法及び用量の解説 用時よく振り混ぜた後、通常 1 回 1 ～ 2 滴、1 日 6 ～ 8 回点眼する。 なお、症状により適宜回数を増減する。

薬価 1 本 5 m l

3 1 4 1 . 5 円

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周智の程、宜しく願いいたします。