

静岡市薬剤師会 御中

令和7年8月27日
静岡済生会総合病院 薬剤部

令和7年度 採用・削除のご案内

いつもお世話になっております。新規採用が決定した医薬品（院外限定採用薬を含む）について連絡します。採用薬は、令和7年9月10日より処方開始となります。削除品については、院内在庫がなくなり次第となります。

院内院外採用

エパデールEMカプセル2g

（持田）

効能・効果

高脂血症

用法・用量

イコサペント酸エチルとして、通常、成人には1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセリド高値の程度により、1回4g、1日1回まで増量できる。

薬価 2g 1包 112.60円

ブリィビアクト錠25mg

効能・効果

てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）

用法・用量

通常、成人にはブリーバラセタムとして1日50mgを1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により1日200mgを超えない範囲で適宜増減できる。


薬価 25mg 1錠 373.3円

レズロック錠200mg

（用時購入品）

効能・効果

造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病（ステロイド剤の投与で効果不十分な場合）



用法・用量

成人および12歳以上の小児にはベルモスジルとして200 mgを1日1回食後に経口投与。併用薬に応じて、効果不十分な場合に1回200mg1日2回投与に増量できる

薬価 200 mg 1錠 30,525.9円

レキサルティ OD錠0.5 mg

効能・効果

造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病(ステロイド剤の投与で効果不十分な場合)

用法・用量

成人および12歳以上の小児にはベルモスジルとして200 mgを1日1回食後に経口投与。併用薬に応じて、効果不十分な場合に1回200mg1日2回投与に増量できる

薬価 200 mg 1錠 30,525.9円

ロナセン錠4mg

効能・効果

統合失調症

用法・用量

通常、成人にはブロナンセリンとして1回4mg、1日2回食後経口投与より開始し、徐々に増量する。維持量として1日8～16mgを2回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は24mgを超えないこと。

通常、小児にはブロナンセリンとして1回2mg、1日2回食後経口投与より開始し、徐々に増量する。維持量として1日8～16mgを2回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は16mgを超えないこと。

薬価 4 mg 1錠 78.5円

オンボー皮下注 100 mgオートインジェクター (用時購入)

オンボー皮下注 200 mgオートインジェクター (用時購入)

効能・効果

中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)

中等症から重症の活動期クローン病の治療(既存治療で効果不十分

な場合に限る)

用法・用量

〈潰瘍性大腸炎〉

ミリキズマブ（遺伝子組換え）点滴静注製剤による導入療法終了 4 週後から、通常、成人にはミリキズマブ（遺伝子組換え）として 1 回 200 mg を 4 週間隔で皮下投与する。（100mg 2 キットを使用）

〈クローン病〉

ミリキズマブ（遺伝子組換え）点滴静注製剤による治療終了 4 週後から、通常、成人にはミリキズマブ（遺伝子組換え）として 1 回 300 mg を 4 週間隔で皮下投与する。（100mg と 200mg を各 1 キット使用）

薬価	100mg	1 キット	125,123 円
	200mg	1 キット	242,888 円

ビンゼレックス皮下注 320mg オートインジェクター (用時購入)

効能・効果

尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症

乾癬性関節炎

強直性脊椎炎、X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎

化膿性汗腺炎

用法・用量

〈尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症〉

1 回 320mg を初回から 16 週までは 4 週間隔で皮下注射し、以降は 8 週間隔で皮下注射する。なお、患者の状態に応じて 16 週以降も 4 週間隔で皮下注射できる。

〈乾癬性関節炎〉〈強直性脊椎炎、X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎〉

1 回 160mg を 4 週間隔で皮下注射する。

〈化膿性汗腺炎〉

1 回 320mg を初回から 16 週までは 2 週間隔で皮下注射し、以降は 4 週間隔で皮下注射する。なお、患者の状態に応じて 16 週以降も 2 週間隔で皮下注射できる。

薬価	320mg	2mL	1 キット	303,466 円
----	-------	-----	-------	-----------

レギュニール 4.25 腹膜透析液シングルバック・機器専用 2000ml

(用時購入)

効能・効果

骨粗鬆症

関節リウマチに伴う骨びらの進行抑制

用法・用量

慢性腎不全患者における腹膜透析（高マグネシウム血症の改善が不十分な場合で、かつカルシウム製剤や活性型ビタミンD製剤の投与により高カルシウム血症をきたすおそれのある場合に用いる。

薬価 2 0 0 0 m l 1 袋 1, 1 0 5 円

院外限定採用

セディール錠 10mg

効能・効果

神経症における抑うつ、恐怖

心身症（自律神経失調症、本態性高血圧症、消化性潰瘍）における身体症候な

らびに抑うつ、不安、焦躁、睡眠障害

用法・用量

通常、成人にはタンドスピロンクエン酸塩として1日 30mg を3回に分け経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減するが、1日 60mg までとする。

薬価 1 0 m g 1 錠 1 5 . 5 円

令和7年度前期削除品目リスト

削除薬品	一般名	効能・効果	同効薬(備考)
エストラサイト カプセル156.7mg (製造中止)	エストラム スチンリン 酸エステル ナトリウム 水和物	前立腺癌	カソデックスOD錠80mg、 イクスタンジ錠40mg、80 mg、オダイン錠125mg、 アーリーダ錠60mg、ザイ ティガ錠250mg
ガストローム顆 粒66.7% (製造 中止)	エカベトナト リウム水和 物	下記疾患の胃粘膜病変(びらん、 出血、発赤、浮腫)の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪 胃潰瘍	アルロイドG内用液、ガスロ ンNOD錠2mg、アルサル ミン内用液、プロマックD 錠5mg、レパミピド錠100 mg
ジャカビ錠5mg	ルキシリ チニ プリ ン酸塩	骨髄線維症 真性多血症(既存治療が効果 不十分又は不適当な場合に限 る) 造血幹細胞移植後の移植片対 宿主病(ステロイド剤の投与 で効果不十分な場合)	院外限定に変更
セファランチン 末1%	セファラン チン	放射線による白血球減少症 円形脱毛症・粒糠性脱毛症	院外限定に変更 セファランチン注10mg
ラコールNF配合 経腸用半固形剤		一般に、手術後患者の栄養保 持に用いることができる が、特に長期にわたり、経口 的食事摂取が困難な場合の 経管栄養補給に使用する。	イノソリッド配合経腸用半 固形剤

削除薬品	一般名	効能・効果	同効薬(備考)
マイザークリー ム0.05% (院外 限定薬)(製造中 止)	ジフルプレ ドナート	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ピ ダール苔癬、脂漏性皮膚炎、放射線皮 膚炎、日光皮膚炎を含む)、痒疹群(蕁 麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻 疹、結節性痒疹を含む)、虫さされ、乾 癬、掌跖膿疱症、扁平紅色苔癬、ジベル ばら色粒糠疹、薬疹・中毒疹、慢性円板 状エリテマトーデス、紅斑症(多形滲出性 紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑、遠心性丘 疹性紅斑)、特発性色素性紫斑(マヨッ キー紫斑、シャンパーク病、紫斑性色素 性苔癬様皮膚炎)、紅皮症、肉芽腫症 (サルコイドーシス、環状肉芽腫)、円形 脱毛症、アミロイド苔癬(斑状アミロイ ドーシスを含む)、肥厚性瘢痕・ケロイド	マイザー軟膏0.05%

一般名処方変更

削除薬品	一般名	院内後発品	院外一般名
アスペノンカプセル10mg（院外限定）	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg	なし	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル10mg
アスペノンカプセル20mg（院外限定）	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg	なし	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル20mg
サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
サンリズムカプセル50mg（院外限定）	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	なし	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg
シベノール錠50	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg
シベノール錠100（院外限定）	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	なし	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg

削除薬品	一般名	院内後発品	院外一般名
タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩錠50mg	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg
タンボコール錠100mg（院外限定）	フレカイニド酢酸塩錠100mg	なし	【般】フレカイニド酢酸塩錠100mg
プロノン錠150mg（院外限定）	プロパフェノン塩酸塩錠150mg	なし	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg
メキシチールカプセル50mg（院外限定）	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	なし	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
削除薬品	一般名	院内採用品	院外採用品
ラゲブリオカプセル200mg		ラゲブリオ錠400mg	ラゲブリオ錠400mg

ご多用中とは存じますが、会員の皆様への周知の程、宜しく願いいたします。